

IVÖSJÖNS FISKBESTÅND. PROVFIKKE PÅ 64 STATIONER MED BOTTENSATTA ÖVERSIKTSNÄT. PROCENTUELL FÖRDELNING AV BIOMASSAN (kg fisk)

FISKART	2003	2007	2012	Medeltal %	Jämförelse med	
					Immeln 1965	Oppmannasjön 1976
<u>Abborre</u>	62,5	52,7	57,1	57,4	27,5	17,2
Mört	14,0	23,6	14,1	17,4	48,3	38,0
Braxen	8,0	7,9	8,0	8,0	0,8	33,9
<u>Lake</u>	3,2	4,9	5,3	4,5	0,1	0
Björkna	3,6	1,5	4,8	3,3	<0,1	ingår i braxen
Gärs	4,3	3,1	1,4	2,9	0,3	0,4
<u>Gös</u>	0,6	1,7	5,8	2,7	0	0,9
Sarv	1,5	2,9	2,9	2,4	0,1	2,8
Benlöja	0,9	0,1	0,4	0,5	0,6	3,9
<u>Gädda</u>	0	0,9	0	0,3	12,4	1,8
Sutare	0,8	0	0	0,3	0,1	0
Nors	0,4	0,2	0,1	0,2	0	0
<u>Siklöja</u>	0,1	0,6	< 0,1	0,2	0	0
Nissöga	<0,1	0	<0,1	<0,1	0	0
<u>Sik</u>	0	0	0	0	9,1	0
<u>Öring</u>	0	0	0	0	0,7	0
Ruda	0	0	0	0	0	1,1
<b>Konsumtions- fisk (markerade arter)</b>	<b>66,4</b>	<b>60,8</b>	<b>68,2</b>	<b>65,1</b>	<b>49,7</b>	<b>19,9</b>
<b>Övrig fisk</b>	<b>33,6</b>	<b>39,2</b>	<b>31,8</b>	<b>34,9</b>	<b>50,3</b>	<b>80,1</b>
<b>Total fångst, kg</b>	<b>114,6</b>	<b>73,2</b>	<b>97,0</b>	<b>94,9</b>	<b>553</b>	<b>290</b>

Provfisket i Ivösjön visar på ett ökande gösbestånd. Benlöjan varierar mycket i förekomst. Översiktsnäten fångar ytterst få gäddor - ger en skev bild av beståndet. Fisket i Immeln skedde med biologisk provtagningslänk under 30 fiskedygn. Varje natt fiskades med 26 nät vilka var mycket bättre anpassade att fånga gädda. Fisket i Oppmannasjön skedde med översiktnät. Fångsten i Ivösjön utgörs till 2/3 av konsumtionsfisk, i Immeln till hälften och i Oppmannasjön endast 1/5. Rekommendation från Sötvattenslaboratoriet 1977: Främst trålfiske efter vitfisk (30 ton per år), gösfiskeförbud 15 april-1 juni samt utsättning av större mängd ål. Brodde Almer