

BRED BINNIKEMASK HOS ABBORRE I IVÖSJÖN 1963 - 2008

ÅR	INFEKTIONS-%	LARVER PER 100 FISKAR
1963	35	?
1964	71	?
1965	83	190
1966	91	339
1967	89	339
1968	94	375
1969	96	407
1970	86	317
1971	71	212
1972	46	72
1973	31	51
1974	24	34
1975	18	25
1976	17	21
1977	6	7
1978	4	8
1979	5	5
1980	2	2
1981	9	10
1982	2	3
1983	12	12
1986	15	18
1989	18	20
1990	24	29
1992	10	12
1996	0	0
1999	1	1
2002	1	1
2008	0	0

BRED BINNIKEMASK (*Diphyllobotrium latum*) HOS ABBORRE I IVÖSJÖN

Endast muskulaturen undersökt: 100 abborrar per år i storleksklasserna: 12-18 cm 33 st, 18.1-22.5 cm 34 st och 22.6 cm och större 33 stycken. Fisken fångad vid Smeören i norra delen av Ivösjön.

Efter att det nya reningsverket i Jämshög blev klart 1970 minskade infektionen mycket. Bräddningar medförde dock åter en ökning. Vid senaste undersökningen 2008 påträffades inga larver (plerocerkoider).

Redogörelser för infektionen i Ivösjön finns bl.a. att läsa i mina skrifter:

1973. Bekämpning av binnkemasken *Diphyllobotrium latum* (L.). Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Nr 15: 1973.

1974. Bekämpning av binnkemasken *Diphyllobotrium latum*(L.), Statens Naturvårdsverk, PM 460, NLU Rapport 74.

2009. Noll till sjuttio. Minnen ur min levnad. Sidorna 55-62 (finns bl.a. på Bromölla bibliotek och stadsbiblioteket i Malmö). .

Brodde Almer (25 jan.2011)